Drikkevannstilsetning til fjørfe

Felleskjøpet



Bruksområde						
Uavklart situasjon og stress mot både Gram (+) og Gram (-) bakterier som *E. coli* og *C. perfringens*	**Gram (-) bakterier** mot f. eks. *E. coli*	**Gram (+) bakterier** mot f. eks. *C. perfringens*	**Forebyggende tarmhelse** Probiotikum og vitaminer			**Leverhelse**
 FK nr. 16332, 25 ltr	 FK nr. 16333, 25 ltr	 FK nr. 16334, 25 ltr	 FK nr. 16331, 25 tabletter	 FK nr. 16239, 5 ltr	 FK nr. 16241, 5 kg	 FK nr. 16252, 5 ltr
Lumance L i 3-7 dager om gangen	**Protaq 72**	**Protaq 81**	**Ecobiol Fizz** i 3-5 dager	**Pluss Multi-vitaminer** i 1-3 dager	**Clostat**	**FLS liquid** i 14-21 dager hver 8. uke
Bruk og dosering per 1000 liter vann						
Kylling Vekst	**6-12 dl** Dag 19-28	**5-20 dl** Tilpass mengde slik at pH blir ca 4	**10-20 dl**	**1 tablett** Anbefales de første 5 dagene i startfasen og i 3 dager ved fôrskifte	**0,5 dl** per 100 dyr	Dag 14-18: **100 g** Dag 18-32: **50 g**	
Kylling Start	**6-12 dl** Dag 1-4, 2-3 dager før/etter fôrbytte					**50 g** i startfasen	
Kalkun	Uke 1-4: **7-14 dl** >4 uker: **3-7 dl** per 1 000 ltr vann						
Verpe-høner / rugeegg	**6-9 dl** Oppdrett: Dag 1-7 Fra uke 18: 2-3 dager per uke				**0,5 dl** per 100 dyr rugeegg **0,9 dl** per 100 dyr verpehøner		**Forebyggende** Kur: **10 dl** 25 og 50 uker. **Behandlende** Kur: **25 dl**

Sjekk produktdatablad for mer detaljert informasjon om bruk og dosering



pluss

Drikkevanns-tilsetning til fjørfe

- ✓ Drikkelinjene bør alltid rengjøres før og etter bruk av tilsetningsstoffer
- ✓ Velg riktig produkt tilpasset situasjonen i fjøset
- ✓ Kalk og andre stoffer i vannet kan påvirke doseringen, test derfor med teststrips for pH.
- ✓ Bruk stoffene når det trengs/ forebyggende
- ✓ Følg anbefalt dosering, «mer» er ikke bedre og «mindre» er heller ikke godt nok
- ✓ Disse stoffene er hjelpemidler men erstatter **ikke** godt renholdt, tilsyn i fjøset og besetningsveterinær

Felleskjøpet

Ta vare på jorda, dyra og framtida

Kromat Drikkevannstilsetning A4.indd 2 20.08.2026 10:19